



中华人民共和国国家标准

GB 29962—2013

食品安全国家标准 食品添加剂 2-巯基-3-丁醇

2013-11-29 发布

2014-06-01 实施

中华人民共和国
国家卫生和计划生育委员会 发布

食品安全国家标准

食品添加剂 2-巯基-3-丁醇

1 范围

本标准适用于由 2-巯基-3-丁酮为原料制得的食品添加剂 2-巯基-3-丁醇。

2 化学名称、分子式、结构式和相对分子质量


2.1 化学名称

2-巯基-3-丁醇

2.2 分子式

C₄H₁₀OS

2.3 结构式



2.4 相对分子质量

106.18（按 2007 年国际相对原子质量）

3 技术要求

3.1 感官要求

感官要求应符合表1的规定。

表 1 感官要求

项 目	要 求	检验方法
色泽	无色至浅黄色	将试样置于比色管内，用目测法观察
状态	液体	
香气	强烈的刺激性气味，稀释后有葱香、肉香	GB/T 14454.2

3.2 理化指标

理化指标应符合表2的规定。

表2 理化指标

项 目	指 标	检验方法
2-巯基-3-丁醇含量(两个异构体总和), w% \geq	99.0	附录 A
折光指数(20 °C)	1.476~1.485	GB/T 14454.4
相对密度(25 °C/25 °C)	1.010~1.017	GB/T 11540

附录 A

2-巯基-3-丁醇含量的测定

A.1 仪器和设备

A.1.1 色谱仪：按GB/T 11538—2006中第5章的规定。

A.1.2 柱：毛细管柱。

A.1.3 检测器：氢火焰离子化检测器。

A.2 测定方法

面积归一化法：按 GB/T 11538—2006 中 10.4 测定含量。

A.3 重复性及结果表示


按 GB/T 11538—2006 中 11.4 规定进行，应符合要求。

食品添加剂 2-巯基-3-丁醇气相色谱图(面积归一化法)参见附录 B。

附录 B
食品添加剂 2-巯基-3-丁醇气相色谱图
(面积归一化法)

B.1 食品添加剂 2-巯基-3-丁醇气相色谱图

见图B.1。



- 1——2-巯基-3-丁醇异构体1；
2——2-巯基-3-丁醇异构体2。

图 B.1 食品添加剂2-巯基-3-丁醇气相色谱图

B.2 操作条件

- B.2.1 柱：毛细管柱，长30 m，内径0.25 mm。
B.2.2 固定相：聚乙二醇。
B.2.3 膜厚：0.25 μm 。
B.2.4 色谱炉温度：120 $^{\circ}\text{C}$ 恒温10 min；然后线性程序升温从120 $^{\circ}\text{C}$ ~200 $^{\circ}\text{C}$ ，速率10 $^{\circ}\text{C}/\text{min}$ ；最后在200 $^{\circ}\text{C}$ 恒温20 min。
B.2.5 进样口温度：240 $^{\circ}\text{C}$ 。
B.2.6 检测器温度：240 $^{\circ}\text{C}$ 。
B.2.7 检测器：氢火焰离子化检测器。
B.2.8 载气：氮气。
B.2.9 柱前压：60 kPa。
B.2.10 进样量：约0.2 μL 。
B.2.11 分流比：100 : 1。